

萘敏维滴眼液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：萘敏维滴眼液

英文名称：Naphazoline Hydrochloride, Chlorphenamine Maleate and Vitamin B₁₂ Eye Drops

汉语拼音：Naiminwei Diyanye

【成份】本品为复方制剂，每支 10 毫升含盐酸萘甲唑啉 0.2 毫克、马来酸氯苯那敏 2 毫克、维生素 B₁₂ 1 毫克。

辅料为：甘油、依地酸二钠、苯扎溴铵、硼酸、注射用水。

【性状】本品为粉红色的澄明液体，具有特殊的气味。

【作用类别】本品为眼科用药类非处方药药品。

【适应症】用于缓解眼睛疲劳、结膜充血以及眼睛发痒等症状。

【规格】10 毫升

【用法用量】滴眼，一次 1~2 滴，一日 3~4 次。

【不良反应】1.眼部反应：偶见瞳孔散大、充血加重、刺激、眼部不适、视物模糊及轻度炎症。

2.全身反应：偶见晕眩、头痛、恶心、焦躁、思睡、血压升高、心律失常以及血糖升高等。

【禁忌】闭角型青光眼患者禁用。

【注意事项】

- 1、儿童，尤其是婴儿使用可能会发生中枢神经抑制，导致昏迷和体温显著下降。因此，婴儿和儿童必须在医师指导下使用。
- 2、连用 3—4 日，症状未缓解，请咨询医师或药师。
- 3、打开后应在 4 周内用完，逾期请勿使用。
- 4、心血管疾病、糖尿病、高血压、甲状腺功能亢进和眼部感染患者慎用。
- 5、孕妇及哺乳期妇女慎用。
- 6、在使用过程中，如发现眼红、疼痛等症状应停药就医。
- 7、滴眼时请勿使管口接触手和眼睛，使用后应将瓶盖拧紧，以免污染药液。
- 8、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 9、本品性状发生改变时禁止使用。
- 10、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 11、儿童必须在成人监护下使用。
- 12、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

- 1.单胺氧化酶抑制剂或拟交感药物不能与本品同用。
- 2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】萘甲唑啉为拟肾上腺素药，具有收缩血管作用，可缓解因过敏及炎症引起的眼充血症状；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，可减轻眼部过敏症状；维生素 B₁₂ 对维持眼部神经功能有一定作用。

【贮藏】密封保存。

【包装】聚酯药用滴眼剂瓶装，10ml/支，1 支/盒。

【有效期】24 个月

【执行标准】《中国药典》2010 版二部

【批准文号】国药准字 H20044429

【说明书修订日期】2010 年 10 月 01 日

【生产企业】

企业名称：湖北远大天天明制药有限公司

生产地址：湖北省武汉市经济技术开发区高新技术工业园 28 号

邮政编码：430056

电话号码：027-59885707

传真号码：027-59885708

客服电话：027-83835298

网址：<http://www.ttmyy.com>

如有问题可与生产企业联系