

白内停 OTC 外

吡诺克辛钠滴眼液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：吡诺克辛钠滴眼液

英文名称：Pirenexine Sodium Eye Drops

汉语拼音：Binuokexinna Diyanye

【成份】药片每片含吡诺克辛钠 0.8 毫克，辅料为：牛磺酸、硼酸、无水乙醇；

溶剂辅料为：氯化钾、硼酸、硼砂、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、氢氧化钠、注射用水。

【性状】本品的药片为橙红色片，专用溶剂为无色透明液体。

【作用类别】本品为眼科用药类非处方药药品。

【适应症】主要治疗初期老年性白内障、轻度糖尿病性白内障或并发性白内障等。

【规格】每粒药片含吡诺克辛钠 0.8 毫克，附 15 毫升专用溶剂 1 瓶。（15 毫升：0.8 毫克）

【用法用量】滴眼。一次 1~2 滴，一日 3~4 次。



【不良反应】极少数患者可有轻微眼部刺激。

【禁忌】眼外伤及严重感染时，暂不使用，或遵医嘱。

【注意事项】

1. 使用前须将 1 片药片投入 1 瓶溶剂中，待药物完全溶解后，方可使用。片剂溶解入溶剂后，应连续使用，在 20 天内用完。
2. 糖尿病引起的白内障患者，应在使用本品的同时，在医师指导下结合其他方法治疗。
3. 滴眼时请勿使管口接触手和眼睛，避免污染瓶内眼药水。
4. 本品宜避光保存；使用后请拧紧瓶盖，以防污染。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品通过保持和改善晶状体膜的功能、阻止多元糖醇的积累而防止或减少晶状体混浊。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】（1）每盒装有药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装的药片一片；盛有 15 毫升溶剂的低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶一瓶。



(2) 每盒装有药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片包装的药片二片；盛有 15 毫升溶剂的低密度聚乙烯药用滴眼剂瓶二瓶。

(每瓶溶剂对应药片一片)。

【有效期】24 个月

【执行标准】部颁标准 1995 年版二部第四册。

【批准文号】国药准字 H42021940

【说明书修订日期】2007 年 04 月 06 日

【生产企业】

企业名称：湖北远大天天明制药有限公司

生产地址：湖北省武汉市经济技术开发区高新技术工业园 28 号

邮政编码：430056

电话号码：027-59885707

传真号码：027-59885708

客服电话：027-83835298

网址：<http://www.ttmyy.com>

如有问题可与生产企业联系

湖北远大天天明制药有限公司

EBE PHARMACEUTICAL CO.,LTD